

CLAUDIO PULCHER

DATI SULLO SVERNAMENTO DEGLI ANATIDI IN PIEMONTE

GENNAIO 1979

Nel mese di Gennaio 1979 sono state effettuate numerose visite ad alcune località piemontesi note come sedi regolari di svernamento per gli Anatidi. Il clima, particolarmente rigido durante questo mese, ha determinato il completo gelarsi di alcuni laghi (Lago piccolo di Avigliana, Lago di Candia, Lago di Arignano ecc.) dal 5-10 del mese fino all'inizio di Febbraio. Ciò ha causato una notevolissima dispersione di Anatidi verso i corsi d'acqua liberi dal ghiaccio, rendendo pressoché impossibile una valutazione significativa del numero di uccelli presenti. I dati che proponiamo non interessano forse che meno del 50% delle anatre presenti nella regione in Gennaio. I movimenti, anche rispetto ai laghi maggiori, sono risultati molto ampi anche durante questo mese, coinvolgendo talvolta migliaia di individui. In qualche caso (ad es. Pesciola e Quattrocchi) si sono osservati probabilmente i medesimi individui in località e date differenti. Sono riportate nella tabella alcune specie di un certo interesse non appartenenti all'ordine degli Anseriformi; aggiungiamo ancora come durante tutto l'inverno il Piemonte sia interessato da una massiccia presenza di Gabbiani comuni svernanti, il cui numero può essere valutato in alcune decine di migliaia.

La Tabella I riporta località, date ed osservatori nelle diverse uscite; la Tabella II riassume i dati, offrendo per ciascuna specie il numero massimo di individui osservato in ciascuna località e la data dell'osservazione stessa (fra parentesi).

OSSERVATORI:

Giovanni Boano (Carmagnola, TO): GB

Franco Carpegna (Torino): FC

Toni Mingozzi (Piossasco, TO): TM

Claudio Pulcher (Torino): CP

Giuseppe Raghino (Santhià, VC): GR

Manlio Vineis (Torino): MV

TABELLA I

LOCALITA', DATE E OSSERVATORI

- A) LAGHI DI AVIGLIANA: 3-1 GB; 5-1 FC e MV; 7-1 FC e MV; 13-1 GB; 15-1 FC e MV; 16-1 CP; 20-1 TM; 25-1 FC e MV; 31-1 TM.
- B) LAGO DI VIVERONE: 3-1 GR; 11-1 FC e CP e MV; 13-1 CP; 21-1 GB.
- C) LAGO DI CANDIA: 1-1 GB e TM; 13-1 CP; 16-1 FC e MV.
- D) BIANZÈ - Tesa di Cascina Bava: 1-1 GB e TM; 19-1 FC e MV; 30-1 FC e MV.
- E) FIUME PO - Comune di Carmagnola: 6-1 GB; 7-1 GB; 8-1 GB; 20-1 GB.
- F) FIUME PO - Comune di Crescentino: 15-1 GB e CP; 17-1 FC e MV.
- G) FIUME PO - Comuni di S. Mauro e Chivasso: 13-1 CP; 21-1 GB.
- H) LAGO DI SALASCO: 7-1 GR.




Fig. 1 Una piccola parte degli Anatidi (in grande maggioranza Germani reali) svernanti sul lago di Viverone, 27-1-1980 (foto T. Mingozzi).

N.d.R.: Il giorno 3-1 sono stati osservati lungo il torrente Orba in comune di Silvano d'Orba 3 Oche colombaccio (*Branta bernicla*), 3 Oche granaiole (*Anser fabalis*), 2 Smerghi maggiori (*Mergus merganser*). Nella stessa loc. il giorno precedente era stato catturato un Fistione turco (*Netta rufina*) (si veda F. Silvano, 1979, *Riv. It. Orn.*, Milano, pag. 108).

TABELLA II

	A	B	C	D	E	F	G	H
Strolaga mezzana	1 (3 e 7/1)							
Svasso maggiore	5 (13/1)	80 (13/1)					1 (21/1)	
Svasso piccolo		1 (13/1)						
Tuffetto		14 (13/1)						
Oca lombardella					1 (8/1)			
Germano reale	900 (16/1)	5000 (21/1)	300 (1/1)	100 (1 e 30/1)	110 (5/1)	700 (15/1)		45 (7/1)
Alzavola				15 (19/1)	8 (6/1)	300 (15/1)		
Mestolone					4 (8/1)	2 (15/1)		
Codone						4 (15/1)		
Fischione					1 (8/1)	1 (15/1)		
Moriglione		15 (13/1)	15 (1/1)		1 (20/1)	3 (15/1)	1 (13/1)	
Moretta	14 (5/1)	12 (3/1)		2 (19/1)		7 (15/1)	5 (20/1)	
Moretta tabaccata								2 (7/1)
Quattrocchi	2 (16/1)	1 (11/1)		2 (19/1)		7 (15/1)	5 (21/1)	
Orco marino			1 (1/1)					
Smergo maggiore	5 (13/1)	2 (13/1)			1 (8/1)			
Smergo minore	3 (31/1)				1 (8/1)			1 (7/1)
Pesciaiola						1 (15/1)	1 (21/1)	