

ARNALDO BORDONI *

**UNO STAFILINIDE NUOVO PER L'ITALIA
RACCOLTO NELL'ALTA VAL GESSO (COLEOPTERA)
88° contributo alla conoscenza degli Staphylinidae
(Coleoptera, Staphylinidae)**

SUMMARY - *Quedius subalpestris*, Coiffat new for Italy. The staphylinid *Quedius subalpestris* Coiffait, previously known only from France, is reported for the first time from Italy (Val Gesso, Cuneo); the systematic position of this species in the subgenus *Microquedius* Coiff. is discussed (Coleoptera, Staphylinidae).

RIASSUNTO - Si dà notizia della raccolta nell'alta Val Gesso (Cuneo) di *Quedius (Microquedius) subalpestris* Coiffait, specie nuova per l'Italia, nota fino ad ora solo delle Alpi Marittime francesi; l'A. ne chiarisce la posizione sistematica all'interno del sottogenere, composto da entità montane (Coleoptera, Staphylinidae).

Durante una breve ricerca in Val Gesso (Alpi Marittime) il 5 agosto 1982 ho effettuato una raccolta nella parte alta del « Vallone della Casa » a circa 1900 m (Terme di Valdieri), vagliando detriti alla base di rododendri, di piccoli arbusti ricoperti di muschio, lungo il corso di un torrentello. In tale ambiente ho trovato una piccola serie di Coleotteri non rari in tale zona¹ assieme ad alcuni esemplari di uno Stafilinide nuovo per la fauna italiana.

Quedius (Microquedius) subalpestris Coiff., 1963.

La specie fu descritta sulla base di 1 maschio di Saint-Martinn-Lantosque e di 1 femmina di « Tende, Marguareis, 2200-2600 m, VI-1952, H. Coiffait leg. » (versante francese) (coll. Coiffait, Tolosa) e nota, a quanto so, di un solo altro esemplare, anch'esso proveniente dal versante francese del Marguareis, 2500 m.

Grazie alla cortesia del collega dr. H. Coiffait che ringrazio, ho esaminato questi tre esemplari, ai quali corrispondono perfettamente i 2 maschi e la femmina da me raccolti in Val Gesso. Questi sono i primi trovati in territorio italiano e

* Museo Zoologico « La Specola » dell'Università di Firenze.

¹ Elenco delle specie raccolte: *Trechus putzeysi putzeysi* (Pand.) (Carabidae); *Olophrum alpinum* Heer, *Lesteva nivicola* Fauv., *Quedius dubius* Heer (Staphylinidae); *Otiorhynchus pauxillus* Rosh. (Curculionidae).

subalpestris Coiff. (Alpi Marittime: Val Gesso); *haberfelneri* Epp. (Alpi orientali); *xanthippae* Lohse (Alpi dalle Marittime alle Venete almeno);
alpestris Heer (probabilmente tutta la catena alpina ad alta quota);
auricomus Kiesw. (geonemia da definire).

BIBLIOGRAFIA

- BORDONI A., 1974 - Studi sulla sistematica e la geonemia del genere *Quedius* Steph. - V - I
Microquedius Coiffait della fauna italiana (*Col. Staphylinidae*) - *Redia*, 55: 203-209.
COIFFAIT H., 1963 - Les *Quedius* de sous-genre *Sauridus* de la région paléartique occidentale:
Bull. Soc. Hist. Toulouse, 98 (3-4): 391-420.