

LUCIO BORDIGNON *

ULTERIORI OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE NELLE BARAGGE BIELLESI

SUMMARY - *Further ornithological research in the « baragge » of Vercelli (Piedmont NW Italy).*

This area, which are tendentially barren moorland with a stunted vegetation, had been the subject of a previous article (Bordignon 1982). Now the author, having further prospectet the area, updates the list adding 46 species to the 121 wich had previously been identified. Among the new species observed, following are the rarest breeding ones: Stock Dove *Columba oenas*, Bee-eater *Merops apiaster*, Mistle Thrush *Turdus viscivorus* and Lesser Spotted Woodpecker *Picoides minor* and Merlin *Falco columbarius*, Great Snipe *Gallinago media*, Eagle Owl *Bubo bubo*, Roller *Coracias garrulus*, Wood Lark *Melanocorypha calandra* and Lesse Grey Shrike *Lanius minor*, are the rarest between the passage visitors.

The above-mentioned area, wich is disappearing owing to the agricultural reclamation (carried out mainly in order to grow rice) is a very interesting on and ought to be protected.

RIASSUNTO - Le « baragge » di Vercelli, brughiere con vegetazione stentata e tendenzialmente arida, erano state oggetto di una precedente pubblicazione (Bordignon 1982). Ora a distanza di un lustro, l'autore, che ha protratto ulteriormente l'indagine ornitologica, ne aggiorna l'elenco, aggiungendo 46 specie alle 121 precedentemente contattate. Tra le nuove specie quelle più localizzate come nidificanti risultano: Colombella *Columba oenas*, Gruccione *Merops apiaster*, Tordella *Turdus viscivorus* e Picchio rosso minore *Picoides minor*; mentre di passo sono rare: Smeriglio *Falco columbarius*, Croccolone *Gallinago media*, Gufo reale *Bubo bubo*, Ghiandaia marina *Coracias garrulus*, Calandra *Melanocorypha calandra* e Averla cenerina *Lanius minor*. L'area indagata si presenta molto interessante avifunisticamente e sarebbe meritevole di tutela, mentre sta per scomparire a causa della bonifica agricola.

In un precedente lavoro (Bordignon 1982) avevo elencato le specie (121 in totale) da me osservate antecedentemente l'estate del 1982 nelle baragge biellesi. A distanza di un lustro, in cui ho continuato, anche se con minor regolarità, le mie osservazioni in queste aree, ritengo interessante produrre un nuovo elenco che, aggiunto a quello primitivo, meglio definisca la componente avifaunistica del comprensorio in esame. I confini di questo furono già definiti nel precedente lavoro, al quale rimando i lettori, aggiungendo per precisione, che l'indagine è stata estesa anche ai comuni di Gattinara e Lozzolo, dove ancora esistono superfici di una certa estensione (cumulativamente minori ai 150 ha) di brughiera; quindi, sarebbe più esatto parlare di osservazioni nelle « baragge vercellesi » e non solamente « biellesi ».

* Via Vioglio, 16 - 13050 Soprana (VC).

La sequenza sistematica è quella proposta da Brichetti e Massa (1984).

- Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*. Osservato 1 individuo il 10-4-1983 (tamponi Tarello,¹ baraggia di Masserano).
- Tarabusino *Ixobrychus minutus*. Nidificazione accertata. Osservato 1 juv. non volante il 31-7-1984 in uno stagno di origine artificiale (loc. Settesorelle, Baraggia di Brusnengo).
- Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*. Osservato 1 adulto il 16-5-1982, in pastura in risaie limitrofe alla baraggia (loc. Stazione di Masserano ex baraggia di Masserano).
- Oca granaiola *Anser fabalis*. Osservati 6 individui il 24-11-1985, in pastura in una stoppia di mais circondata da tre lati dalla brughiera (loc. Settesorelle, baraggia di Brusnengo).
- Codone *Anas acuta*. Osservato un gruppo di 55-60 individui il 30-10-1982 che tentava di calarsi sui tamponi Franciscono (baraggia di Masserano), ora trasformati in risaia.
- Moretta *Aythya fuligula*. Osservata una coppia il 17-11-1983 (tamponi Franciscono, baraggia Masserano).
- Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*. Nidificazione accertata. Un juv. pronto all'involo osservato il 12-8-1985 nei pressi del nido (loc. Rollino, Baraggia di Masserano).
- Nibbio bruno *Milvus migrans*. Osservato 1 individuo in volo, a 100 m dal suolo, il 29-4-1986, lungo il torrente Triogna (baraggia di Masserano) ed 1 individuo in volo il 2-5-1985 sulla baraggia di Gattinara.
- Biancone *Circaetus gallicus*. Osservato alcune volte, da marzo ad agosto, un adulto (facente parte quasi sicuramente della coppia che si riproduce nelle colline limitrofe) che sfruttava per la caccia la fascia di brughiera tra Gattinara ed Orbello.
Osservato per 3 volte nell'aprile-maggio 1985 e 1986, un adulto (facente parte probabilmente della coppia che sfrutta il Biellese occ.) in caccia nella baraggia militare di Candelo.
- Astore *Accipiter gentilis*. Osservato un juv. il 10-1-1986 mentre inseguiva un Picchio verde (loc. Battiana, baraggia di Lessona).
- Aquila reale *Aquila chrysaetos*. Osservato un individuo in abito del 2° o 3° anno l'11-3-1984 (C.na Biellese, baraggia di Roasio). Vedi anche Bordignon in Toso (1984).
- Smeriglio *Falco columbarius*. Osservato 1 individuo in abito da ♀ il 22-10-1985 (loc. C.na Biellese, baraggia di Roasio).

¹ Con il termine « tamponi », si intende uno o più corpi d'acqua di modesta superficie derivati dallo scavo per l'estrazione di argilla.

- Voltolino *Porzana porzana*. Osservato 1 individuo il 5-6-1983 in uno stagno nella baraggia di Brusnengo. Data tardiva interessante che potrebbe presupporre la nidificazione. L'animale tuttavia non è più stato ricontattato.
- Piviere dorato *Pluvialis apricaria*. 1 individuo catturato il 15-11-1947, facente parte di un gruppo di 5, nella baraggia di Masserano (Coll. Ferrero).
- Piovanello pancianera *Calidris alpina*. Osservati 6 individui il 27-4-1984 in risaie (allagate da pochi giorni) circondate da due lati dalla brughiera (loc. Il Faro, baraggia di Brusnengo).
- Combattente *Philomachus pugnax*. Osservati 12 individui il 27-4-1984 in compagnia dei precedenti.
- Croccolone *Gallinago media*. Osservato 1 individuo (levato insieme a 3 Beccaccini) in uno stagno con brughiera allagata il 10-4-1983 (baraggia di Brusnengo).
- Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*. Osservati 3 individui dal 22 al 25-8-1982 in un prato sfalciato a stretto contatto con la brughiera (loc. Quattro Madame, baraggia di Masserano).
- Chiurlo maggiore *Numenius arquata*. Osservato 1 individuo il 10-4-1986 in piena brughiera (loc. C.na Biellese, baraggia di Roasio); osservato 1 individuo il 19-4-1986 in uno stoppia di mais vicina alla baraggia di Masserano.
- Piro piro boschereccio *Tringa glareola*. Osservato abbastanza regolarmente da aprile a settembre nei tamponi, canali d'irrigazione, ma soprattutto nelle risaie.
- Mignattino *Chlidonias niger*. Osservati 2 individui il 10-5-1983 in volo sulla baraggia di Brusnengo.
- Colombella *Columba oenas*. Nidificazione accertata. Osservati alcuni adulti (almeno 3 coppie) entrare ripetutamente in cavità (offerte da vecchie costruzioni militari) l'1-8-1983 (baraggia militare di Roasio).
- Gufo reale *Bubo bubo*. In seguito a segnalazione (Mussa a voce), controllai 1 individuo trovato morto sotto i cavi dell'alta tensione nel gennaio 1983 (baraggia di Brusnengo).
- Civetta *Athene noctua*. Nidificazione accertata. Osservato 1 individuo trasportare materiale per il nido il 30-3-1986 (C.na Quattro Madame, baraggia di Masserano).
- Succiacapre *Caprimulgus europaeus*. Osservato da maggio a settembre. Nidifica ma è localizzato.
- Rondone maggiore *Apus melba*. Osservati 4 individui il 22-4-1985 in volo basso (loc. Quattro Madame, baraggia di Masserano).
- Gruccione *Merops apiaster*. Nell'estate 1984, 3 coppie si sono riprodotte ad Orbello (Bordignon 1985) in una ex cava di argilla (baraggia di Roasio). Nel medesimo sito 4 coppie si sono riprodotte nell'estate successiva (Boetto a voce).
— 1 coppia si è riprodotta nell'estate 1984 e 1985 alle Quattro Madame

- (baraggia di Masserano), sfruttando un monticello di terra rimasto dopo la trasformazione risicola di un'area baraggiva.
- 1 coppia imbecca 3 pulli, usciti da pochi giorni dal nido, il 19-8-1984 (baraggia militare di Candelo).
- La specie sfrutta molto volentieri la brughiera per la caccia.
- Ghiandaia marina *Coracias garrulus*. Osservato 1 individuo posato sui cavi elettrici il 12-5-1984 (Mussa a voce), in località Chalet (baraggia di Masserano).
- Torcicollo *Jynx torquilla*. Omesso per errore dal primo elenco. Comune in aprile-primi maggio durante la risalita. Meno appariscente (gli animali non cantano) il passo post-riproduttivo. Nidifica localmente.
- Picchio rosso minore *Picoides minor*. Localizzati 2 ♂ cantori nella primavera del 1983 (baraggia di Roasio) ed 1 nella baraggia militare di Candelo nella primavera del 1984. Questa specie non frequenta i boschi xerici isolati dalla brughiera, ma solamente quelli più freschi e di una certa estensione che contengano piante vetuste e marcescenti. Nidifica.
- Calandra *Melanocorypha calandra*. Un individuo catturato il 12-11-1947 nella baraggia di Masserano (Coll. Ferrero).
- Cappellaccia *Galerida cristata*. Osservati 2 individui l'8-5-1984 levarsi in brughiera aperta (loc. C.na Sorte, baraggia Brusnengo). Non si conoscono coppie stabilmente insediate in epoca riproduttiva.
- Spioncello *Anthus spinoletta*. Osservato regolarmente da ottobre ad aprile. Frequenta di solito la risaie, le stoppie di mais ed i prati da sfalcio. Meno frequente in brughiera, dove si nota soprattutto nelle aree allagate senza copertura arborea.
- Merlo dal collare *Turdus torquatus*. Osservata una ♀ il 6-4-1984, pasturare a terra in compagnia di alcune Cesene e Tordi sasselli (loc. Chalet, baraggia di Masserano).
- Tordela *Turdus viscivorus*. Accertata nidificazione. Un adulto in cova il 2-4-1985 sul nido, posto su una farnia isolata a circa 8 metri dal suolo (loc. Quattro Madame, baraggia di Masserano). Questa è l'unica riproduzione accertata per la pianura vercellese, a me nota in tempi recenti. La specie si riproduceva normalmente in aree di pianura e collina fino al dopoguerra (anni 50).
- Cannaiola verdognola *Acrocephalus palustris*. Confermata nidificazione. Osservato 1 adulto con l'imbeccata il 3-7-1986 (rio Triogna, baraggia di Masserano).
- Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*. Udito 1 ♂ in canto il 6-5-1984 nei tamponi Franciscono (baraggia di Masserano). La specie non nidifica per mancanza di canneto nelle aree umide presenti.
- Bigiarella *Sylvia curruca*. Alcune segnalazioni di individui isolati in aprile-maggio e settembre durante i passi.
- Sperpazzola *Sylvia communis*. Presente da fine aprile a settembre. Nidifica localmente con una popolazione minore alle 10 coppie.

- Lù grosso *Phylloscopus trochilus*. Frequente in aprile, durante il passo di risalita, quando si odono parecchi ♂ ♂ cantori.
- Fiorrancino *Regulus ignicapillus*. Osservato 1 individuo il 12-3-1983 (t. Guarbione, baraggia di Brusnengo).
- Pigliamosche *Muscicapa striata*. Accertata nidificazione. Osservato un adulto imbeccare un pullus fuori dal nido il 26-6-1986 (loc. Chalet, baraggia di Masserano).
- Rampichino *Certhia brachydactyla*. Accertata nidificazione. Osservato 1 adulto entrare con l'imbeccata in una grossa crepa di un Pioppo tremulo il 18-5-1985 (Orbello, baraggia di Roasio). La specie frequenta solamente le aree di baraggia con alta copertura di alberi.
- Pendolino *Remiz pendulinus*. Osservati 3 individui il 20-11-1983 in un piccolissimo fragmiteto (tamponi Tarello, baraggia di Masserano).
- Averla cenerina *Lanius minor*. Specie divenuta indubbiamente rara negli ultimi anni. Una sola osservazione di 1 individuo il 12-5-1985 (loc. Chalet, baraggia di Masserano).
- Averla maggiore *Lanius excubitor*. Osservato 1 individuo il 2-1-1985 in ambiente baraggivo (loc. Quattro Madame, baraggia di Masserano). Specie invernale, poco frequente, che si nota soprattutto in risaia (4/5 segnalazioni in media annualmente, note per il Vercellese).
- Corvo imperiale *Corvus corax*. Osservato 1 individuo isolato il 10-4-1986 nella baraggia di Roasio, quasi al limite con le risaie.
- Organetto *Carduelis flammea*. Osservato un gruppo di 7 individui in volo verso Sud-Ovest il 23-10-1985 (baraggia di Lessona).
- Crociere *Loxia curvirostra*. Osservato 1 individuo in volo alto, localizzato grazie alle sue emissioni vocali, che si dirigeva verso Ovest l'1-8-1983 (baraggia militare di Roasio).
- Zigolo nero *Emberiza cirlus*. Gruppo di 6 individui, osservati a terra tra la Molinia che ricercavano cibo, il 20-1-1984 (loc. Settesorelle, baraggia di Brusnengo). Nidifica solo sui rilievi.
- Strillozzo *Miliaria calandra*. Accertata nidificazione. Un adulto con 3 pulli (da pochi giorni usciti dal nido), osservati il 26-6-1986 (loc. Chalet, baraggia di Masserano).

Il protrarsi dell'indagine ornitologica nelle baragge, ha consentito di apportare 42 nuove specie, per un totale complessivo di 163 specie osservate, di cui 67 da ritenersi nidificanti. L'alto numero di specie non fa che confermare il notevole interesse ornitologico di quest'area, che rappresenta indubbiamente il più grosso « incolto naturale » superstite in tutta la Padania. Ambiente peculiare e di estrema importanza non solo per l'avifauna, che merita a pieni voti la salvaguardia integrale. È proprio quest'ultima ragione che mi ha spinto più di ogni altra a ritor-

nare sull'argomento. Questo biotopo sta subendo continuamente una trasformazione, che ha visto, negli ultimi 5 anni, nuovamente ridotta a più di 1/3 la sua esigua superficie globale (6-700 ha, escludendo le baragge militari), a causa della « bonifica » agraria (risicola soprattutto). Questa operazione ha causato anche la colmatatura di quasi tutti i « tamponi » che ospitavano buona parte delle specie acquatiche osservate in zona.

Tutto ciò è accaduto, e continua ad accadere, nonostante la Regione Piemonte abbia imposto, su quasi tutto il comprensorio baraggivo del vercellese orientale, un vincolo ambientale di pre-parco.

La bonifica quindi continua, a dispetto delle leggi, sotto i colpi di un'agricoltura sempre più invadente e sprezzante!

È quindi necessaria l'imposizione immediata di una tutela più rigorosa e definita da parte della Regione, pena la completa distruzione di questo « prezioso » biotopo.

BIBLIOGRAFIA

- BORDIGNON L., 1982 - Osservazioni ornitologiche nelle baragge biellesi - *Riv. Piem. St. Nat.*, 3: 113-126.
- BORDIGNON L., 1985 - Distribuzione nidificante e presenza del Gruccione *Merops apiaster* in provincia di Vercelli - *Avifauna*, 8.
- BRICHETTI P. e MASSA B., 1984 - Check-list degli uccelli italiani - *Riv. It. Orn.*, 54: 3-37.
- TOSO S., 1985 - Nuovi avvistamenti - *Avocetta*, 9: 89-98.